廣西南部郁江建造中的
几种新腕足类*

王 钰

(中国科学院古生物研究所)

(附3圖版)

一. 郁江建造的岩性和时代

珠江上游在廣西境內叫做郁江,自南寧市东至橫縣北境六景圩之間,它的流向大致近于东西。在河谷的南北,露出很多泥盆紀地層。其中以下部中泥盆紀岩層發育最好;不僅剖面整齐,并且化石众多,保存优美,可以說是研究我國西南部中泥盆紀地層和化石群的理想地帶。解放以后,在建筑湘桂鉄路和各縣公路的工程中,由于剥土与挖方的关系,使过去复掩的岩層獲得揭露,化石由風化結果也多脫出,更給古生物学工作者以观察与采集的方便。

廣西境內的下部中泥盆紀地層旧名“吳村頁岩”,标准地区是南寧市以南25公里的吳村圩。1943与1948年,趙金科、鄧玉書、徐焯坚等測制廣西地質圖时,認為:吳村圩附近出露的地層主要是新生代堆積和上泥盆紀石灰岩¹⁾,圩周5—6公里以內並沒有中泥盆紀岩層。同时,沿南寧市至六景的郁江兩岸,則布露廣大面積、富含化石、剖面完整的下部中泥盆紀地層。因此,趙金科1950年建議,用郁江建造一名代替“吳村頁岩”。

根据著者与刘第埔最近的調查結果,郁江建造总厚約230米,自上而下,依岩性与化石帶,可分为下列四層:

上复地層:东崗嶺石灰岩或榴江系。

郁江建造:

4. 灰綠色砂質頁岩,豆綠色致密頁岩,夾厚十数厘米至半米的石灰岩層或凸鏡体。向上,石灰岩層逐漸增多。頂部岩層富鉄質,風化后作赤紫色。 30—45米
3. 黑灰色石灰岩,風化面暗紫色。中部者厚層狀,單層厚50—70厘米,上部与下部則多为薄層或結核狀。石灰岩層面間夾厚数厘米的鈣質頁岩層。石灰岩的風化面上常顯露美丽的瘤狀或龜紋狀的干裂痕。 8—20米
2. 上部多綠色及銀灰色細密頁岩,并夾有多数的石灰岩凸鏡体。頁岩風化后易成碎塊。頁岩向兩側延伸,有

* 1956年2月12日收到

1) 最近著者与刘第埔在这層石灰岩中找到瓣科化石,經盛金章同志鑒定,計有:*Schubertella* sp., ? *Staffella*等。

时可变为厚层石灰岩。下部多土黄色或灰褐色细砂质页岩或钙质砂岩。

65—75米

1. 厚层的坚硬砂岩, 新鲜时青灰色, 风化后则作黑棕色, 下部夹有少数绿色页岩层。

90—100米

下伏地层: 那高嶺页岩(新名)。

郁江建造所含化石以腕足类为最多, 约占全部标本的 80% 以上, 次要的是珊瑚类和苔藓虫类, 三叶虫、头足类、腹足类等则比较少。在上述剖面中, 第一层含化石最少, 仅在上部岩层内, 偶有破碎腕足类标本的内模与外模; 第 3 层的石灰岩内, 化石也不多, 但在层间间的钙质页岩中, 则时常可以采到完整的腕足类标本; 第 2 层和第 4 层是郁江建造的主要化石层, 个体众多, 保存美好, 经风化剥蚀后, 常千百密聚, 出露在层面上或堆积在岩崖下, 俯拾即得, 其丰富程度, 殊为惊人。

本文所描述的腕足类都已见于中国标准化石手册中。计 10 属 10 种:

小嘴贝超科 2 属 2 种: *Camarotoechia parasappho*, *Uncinulus mesodeflectus*。

石燕贝超科 2 属 2 种: *Elytha transversa*, *Mucrospirifer increbescens*。

嘴螺贝超科 1 属 1 种: *Meristella grandis*。

扭形贝超科 3 属 3 种: *Cymostrophia quadratus*, ? *Nervostrophia gigantea*, *Shaleria* (*Telaeshaleria*) *yükiangensis*。

长身贝超科 1 属 1 种: *Chonetes kwangsiensis*。

德姆贝超科 1 属 1 种: *Levenea depressa*。

全部标本系赵金科、鄧玉書、徐煜坚所采集, 产地是六景圩湘桂铁路车站北百余米的低山上, 层位应相当于上述剖面的第 4 层。

作者十分赞同赵金科^[1]的意见, 把郁江建造全部看做是下部中泥盆纪。因为: (1) 郁江建造的下部是粗粒砂岩, 中部是细砂岩和致密页岩, 上部是厚层石灰岩、页岩与石灰岩凸镜体, 使全部岩层成为泥盆纪大沉积轮回内的一个完整的小沉积轮回; (2) 郁江建造的上复地层东岗嶺石灰岩内, 含有标准的 *Stringocephalus*, 而下伏地层那高嶺页岩内, 也产有仅见于中志留纪至下泥盆纪的 *Anastrophia*; (3) 在上述剖面中, 虽说各层都有独具的带化石, 但腕足类的 *Mucrospirifer*, *Uncinulus*, *Dicoelostrophia*, *Shaleria* 等, 珊瑚类的 *Calceola* 等, 苔藓虫类的 *Fistulipora* 等, 在各层都可找到, 并没有显著的上下化石群的不同。

作者曾把文中所记各腕足类标本, 和 Schnur^[2]1854 年所著德国 Eifelian 期腕足类的附图逐一比较, 认为至少有 7 种非常接近于 Eifel 的标本, 现列表如下:

廣西郁江建造中标本	德國萊茵區 Eifelian 層中标本
<i>Camarotoechia parasappho</i>	" <i>Terebratula</i> " <i>hexatoma</i>
<i>Uncinulus mesodeflectus</i>	" <i>Terebratula</i> " <i>goldfussi</i>
<i>Elytha transversa</i>	" <i>Spirifer</i> " <i>undeferus</i>

<i>Mucrospirifer increbescens</i>	" <i>Spirifer</i> " <i>undosus</i>
<i>Mertstella grandis</i>	" <i>Athyris concentrica</i> "
<i>Shaleria (Telaeoshaleria) yükiangensis</i>	<i>Shaleria (Telaeoshaleria) sulcata</i>
<i>Levenea depressa</i>	" <i>Orthis</i> " <i>tetragona</i>

由上表各腕足类的对比,也可以看出郁江建造的地質时期,以归入于下部中泥盆紀較為合理。虽說本文所記标本,不过是郁江建造中腕足类全部材料的一小部份;同时,标本所代表的層位,也僅限于整个剖面的最上層。但前面已經提到, *Uncinulus mesodoflectus*, *Mucrospirifer increbescens*, *Shaleria (Telaeoshaleria) yükiangensis* 等,在郁江建造的上下各層中都可找到,应当看做是郁江建造全体的标准屬种。

二. 郁江建造与坡脚頁岩的对比

在我國西南各省已知的泥盆紀地層中,云南东部坡脚頁岩的化石群,与郁江建造所產者最为近似。根据尹贊勳^[3]鑒定的結果,坡脚頁岩中的腕足类,計有: *Stropheodonta (Dowillina) inaequistriata* var. *pattei* Yin, *S. (Dowillinella) armantica* (Mansuy), *Chonetes* cf. *zeili* Mansuy, *Atrypa reticularis* (Linné), *Spirifer tonkinensis* (Mansuy) 等。时代应相当于中欧的 *Paraspirifer cultrijugatus* 帶,代表我國下、中泥盆紀过渡期的沉積。1947年趙金科^[4]曾指出,坡脚頁岩中並沒有發現 *Paraspirifer cultrijugatus*, 它的全部化石群又非常接近于郁江建造所產屬种。同时,廣西南部的郁江建造与下泥盆紀地層間,有一个顯明的假整合或不整合存在。因此,趙金科主張坡脚頁岩宜归入于下部中泥盆紀。坡脚頁岩的腕足类保存并不太好,大部份是內模或外模,很难和郁江建造中标本作詳細比較。但坡脚頁岩化石群的綜合特性,确实非常接近于郁江建造的第1層上部和第2層所產者。就岩相來講,郁江建造的上部(第3層,第4層)是厚層石灰岩、石灰岩凸鏡体与頁岩的交互層。坡脚頁岩的上面,也整合的露出含标准 Eifelian 期化石的石灰岩。所以趙金科的意見是值得注意的。

三. 郁江建造、那高嶺頁岩和四排頁岩三者之間的关系

由南寧市东至六景圩,五十公里間,在几个剖面上都可以看到郁江建造以明顯的假整合关系和下面的那高嶺頁岩相接触。那高嶺頁岩厚約 50 米,上部是綠色、黃褐色致密坚硬頁岩的互層,下部除綠色頁岩外,还有若干薄的石灰岩夾層或凸鏡体。下部含化石較多,但屬种很少。初步鑒定,計有: *Atrypa*, *Anastrophia*, 小型的石燕貝与無洞貝等,应当是下泥盆紀后期的產物。

在过去文献中,廣西境內海相下泥盆紀地層統名四排頁岩。所以,郁江建造、那高

嶺頁岩与四排頁岩三者之間的关系, 值得詳細討論。

四排頁岩一名系 1929 年馮景蘭^[5]所創立, 标准剖面在修仁縣四排圩南面的祿馬村, 全層厚度由数十米至百余米, 大部份是黃綠色頁岩。所產化石經張席禔^[6]、乐森璋先后鑒定。乐森璋的研究結果, 在抗战期間喪失, 未曾發表; 但在他的珊瑚化石研究的緒論中^[7], 曾指出四排頁岩可分成兩個化石帶, 上部是 *Spirifer paradoxus*¹⁾ 帶, 下部是 *S. hercyniae* 帶。張席禔的研究結果, 記有主要腕足类: *Spirifer paradoxus* cf. *kwangsiensis*, *S.* cf. *primaevus*, *S. tonkinensis*, *S. quadriplicatus* 等。

四排頁岩的下面是金竹垱砂岩, 全厚达 900 米, 依照岩相可分三部: 上部是黃色堅致純淨砂岩, 中部是淡紫紅色不純砂岩, 下部是灰色、黃色云母質砂岩。在上部所夾的頁岩層中, 有小型的石燕貝类, 当时鑒定為 *Spirifer tingi* 与 *S. bourgeoisi*, 因而認為金竹垱砂岩的时代是志留紀。

現在我們試行綜合分析上述記錄。

第一、金竹垱層中部的紫紅色砂岩, 無疑地应和西南各省分布很廣的下泥盆紀地層相对比, 田奇瓊^[8]在 1938 年即作此結論, 認為金竹垱砂岩与云南的龍華山層, 湖南的下跳馬澗系, 廣東的蓮花山系, 是同一地質时期的堆積。所以, 金竹垱層上部所產的小型石燕貝, 不可能是 *Spirifer tingi* 和 *S. bourgeoisi*, 而应当是別屬种。

第二、过去把四排頁岩归入于下泥盆紀的主要理由, 是因为四排頁岩与金竹垱層是連續沉積, 其間並沒有假整合現象存在。現在金竹垱層的地質时代既然已經不是志留紀而是下泥盆紀, 則四排頁岩是否也有成为中泥盆紀的可能?

第三、四排頁岩中的主要腕足类, *Spirifer* cf. *primaevus* 沒有附圖, 無法討論; *Spirifer paradoxus kwangsiensis* 的輪廓形狀和節褶特征, 都和德國的标准种差异很大, 可能是 *Mucrospirifer* 的一种; *Spirifer tonkinensis* 与越南、云南各地所產标本, 确实非常近似。因此, 含腕足类化石的这一部份四排頁岩, 或者可能相当于坡脚頁岩或者郁江建造的下部。

在古生物研究所庫存材料中, 有一个标准的 *Euryspirifer hercyniae* 标本, 產于廣西永福縣矮嶺西雍村附近。所以四排頁岩至少有一部份, 应当屬於下泥盆紀。

綜上所述, 著者認為金竹垱層的上部, 產 "*Spirifer tingi*" 和 *Spirifer bourgeoisi* 的黃綠色頁岩, 很可能相当于南寧市一帶的那高嶺頁岩, 因为那高嶺頁岩中也含有很多的小型石燕貝类化石。含 *Rostrospirifer tonkinensis* 的这一部份四排頁岩, 似乎最好与坡脚頁岩对比, 归入于中泥盆紀。而限制四排頁岩僅包括產 *Euryspirifer hercyniae*

1) 1926 年 Wedekind 用这种腕足类作屬型創立 *Euryspirifer*, 并包括 *S. hercyniae* 在內。

的岩層。著者对廣西境內泥盆紀地層的知識很缺乏，所提意見可能根本錯誤。希望今后的工作同志能注意这几个問題；最重要的，是含小型腕足类的那高嶺頁岩和含 *Eury-spirifer hercyniae* 岩層的上下关系。

四. 郁江建造中腕足类的子遺屬种及其所代表的意义

本文描述的 10 种腕足类中, *Uncinulus mesodoflectus* 和 *Cymostrophia quadratus* 两种, 对研究泥盆紀化石群的演化中心与迁移方向問題上, 具有特別重要的意义。因为兩者都是郁江建造化石群內典型的子遺屬种 (Relics 或 Residual Remains)。 *Uncinulus* 在北美首見于中志留紀的 Brownsport 層, 延至下泥盆紀的 Becraft 与 Scotland 層即行滅絕。但在我國中泥盆紀早期仍有存在, 并且种別相当繁多。 *Cymostrophia* 最早產于北美下泥盆紀 Ulsterian 末期的 Onondaga 層, 在中欧也限于捷克下泥盆紀中期 Vinarice 石灰岩 ($f\beta'$) 內。到我國則下部中泥盆紀的郁江建造中仍有代表。从這兩屬腕足类在地理上和地層上的分布情况, 我們似乎有理由相信: 泥盆紀初期的生物演化中心是大西洋区, 而逐漸自西向东迁移。这种推論, 从世界各地下泥盆紀沉積的岩相上, 也可以說明。因为在北美东部和欧洲中部, 都有很厚的下泥盆紀海相地層。而我國西南各省, 下泥盆紀早期的大部份岩層, 都是陸相的碎屑堆積, 直到下泥盆紀的晚期才有很薄的海相地層, 清楚的說明下泥盆紀海侵到达我國的时间較晚。因此, 今后討論我國泥盆紀地層和欧美地層对比的时候, 应当注意此一事实, 詳細分析化石群的全部屬种。如果化石群的絕大部份都表示出中泥盆紀的演化形态, 就不应当因为其中有少数子遺份子, 而归入于下泥盆紀。动物化石的迁移速度, 尤其是固着生动物如珊瑚、腕足类等, 所需时间应当很長, 某区下泥盆紀的标准屬种, 很可能在他区的中泥盆紀或上泥盆紀岩層內, 仍然存在。若是我們不綜合分析各地的岩層輪迴和構造現象, 而机械地把某种化石在世界各地出現的时代划为一致, 所得結論, 就可能不完全合乎事实。

五. 种性的描述和討論

超科 Rhynchonellacea (小嘴貝) Schuchert 1896

屬 *Camarotoechia* (穹房貝) Hall et Clarke 1893

Camarotoechia parasappho Wang sp. nov. (新种)

(圖版 I, 一, 圖 1—5)

Anastrophia perplicata Wang, 1955, 中國标准化石 (無脊椎动物), 第二分册, 頁

129, 圖版 69, 圖 1—4。

貝體較大, 輪廓三角形、卵形或近五角形, 后緣所作成的頂角近 $100-105^\circ$, 前側角闊圓。殼寬大于殼長, 最大寬度位于橫中綫或其稍后方; 鉸合綫短于最大殼寬, 彎曲形。前接合緣作輕微的單褶形。貝體凸度近于等的雙凸型, 腕殼的凸度稍強。

莖殼凸度低緩, 臍部凸隆較高。后部殼面向鉸合綫迅速的降低, 并在殼喙兩側向背方做短距離的彎折。自喙部沿縱中綫至前緣, 殼面的曲度稍急; 翼部的凸度則比較平坦, 均勻地向側緣逐漸斜傾。中槽寬闊, 前端的寬度約等殼寬三分之一, 開始發生在喙部的近前方; 向前延伸時, 迅速加大深度, 并在前端作成一個短闊的舌形体, 彎折緩和。殼喙小, 直聳, 輕微地彎曲。窗孔三角形, 一部分被腕殼的喙部所充塞。窗雙板顯明, 三角形, 內緣互相連接。莖孔大, 近長卵形, 頂部蝕入殼喙上。

腕殼凸隆若复幕, 凸度遠強于莖殼, 最高凸隆處位于中部。殼面向后方、側緣及前側緣的降低速度均頗急峻, 向前緣則比較緩平。中隆低闊, 狹于最大殼寬的三分之一, 初發生時不明顯, 向前延伸時則逐漸升起; 前緣平直, 為莖殼中槽的舌形体所截切。臍部腫脹。喙部強烈彎曲, 掩沒在莖殼的窗孔下。

兩殼外部為特強的殼褶所裝飾, 褶形簡單, 頂部作稜狀, 為狹深的隔隙所分割。中槽中具 4 褶, 中隆上具 5 褶, 兩翼各有 7—8 褶。各殼褶都自喙部即開始顯露, 向前方很快地增加強度, 近后緣的殼褶非常微弱, 有時几乎不存在。若干個體的節褶, 偶而也作插入式的增加。

標本度量(毫米): 長 17.8, 寬 21.5, 厚 11.4, 鉸合綫寬 15.4。

標本類型: 全型, 中科院所 8027。

討論: *Camarotoechia* 這一屬腕足類, 在地質時代上, 延續很長, 自志留紀起即已出現, 到石炭紀仍有遺存。它的內部構造, 與 *Paryphorhynchus* Weller, *Leiorhynchus* Hall, *Pugnoides* Weller 等的性質, 都非常接近。四者腕殼內部都具有一個強大的中隔板和 V 形的背匙形台, 并且鉸板也都是分裂型。但如果把此四屬腕足類的標本并列一處, 就很容易看出, 它們彼此間的外形和殼飾, 確實有極大的差別。*Paryphorhynchus* 的貝體一般都比較巨大, 輪廓多作三角形或圓形, 殼褶闊而圓, 全體殼面上并復有細密的殼紋。*Leiorhynchus* 的貝體輪廓大多數是長卵形, 偶而也有近于圓形的。殼褶圓, 時常分枝, 多數殼褶聚集在殼面的中部, 翼區則常平滑無飾。*Pugnoides* 具有特別高深的中隆和中槽, 節褶數目稀少, 僅發育在貝體的前部, 后部平滑。至于 *Camarotoechia*, 則除貝體輪廓一般作三角形或橫卵形以外, 它的殼褶更多呈稜形或近稜形, 并且節褶自喙部即開始出露, 遍復全體。所以, 上述四屬彼此間的區分是相當顯著的, 并不難于辨

識。

Camarotoechia 這一屬腕足類，種間的变化也特別大。貝體最小者不過幾個毫米，最大時可達兩厘米以上。中槽與側翼上的飾褶數目，或多或少，很不固定。因此，本屬包有的種相當繁多，區分的依據，大部分是外形和飾褶數目的不同，難以看出各種彼此間的演化關係。

僅按外貌來看，無論在具體的輪廓上或飾褶的數目上，當前研究的標本似乎都介於 *Camarotoechia sappho* (Hall)^[9] 和 “*Terebratula*” *hexatoma* Schnur (Schnur: 1853, pl. 23, figs. 2a-e) 之間。前者產於北美的 Hamilton 層，後者產於中歐的 Eifelian 層，都是標準的中泥盆紀地層。*Camarotoechia parasappho* 與 *C. sappho* 同具較大的貝體與狹稜形的飾褶，但新種的輪廓近於三角狀，不像北美種的作橫方形。槽隆上的飾褶數目雖相近，但 *C. sappho* 的褶間間隔比較寬，同時翼區上飾褶數目也比較少，排列也比較疏稀。與 “*Terebratula*” *hexatoma* 的不同處，在於新種貝體的前緣近闊圓形，而非橫直；腕殼的凸度遠為低平；中槽前端的舌形延伸體也特別短。由於沒有歐美的實際標本供作比較，僅依照早年的簡短描述和不準確的手繪石印圖，三種間的區別是否即如上述，很難作肯切的判定。

就已知的材料，在我國西南地區的中泥盆紀地層內，已經記述的 *Camarotoechia* 計有：*C. elliptica* var. *sinensis* Grabau, *C. omaliusi* (Gosselet) 和 *C. yunnanensis* (de Koninck) 三種，葛利普^[10] 在研究我國南方泥盆紀腕足類化石時，曾分別加以介紹。三種的外形與當前的新種很容易辨別，現不擬詳加討論。

在 *Camarotoechia parasappho* 的材料中，有少數標本的殼褶具顯明的分枝現象，著者編述中國標準化石時，曾錯誤置入於 *Anastrophia* 屬，名為 *A. perplicata*。

屬 *Uncinulus* (鈎形貝) Bayle 1878

Uncinulus mesodeflectus Wang sp. nov. (新種)

(圖版 I, 二; 圖 1—5)

貝體大小近中等，狀若正方球，輪廓似五角形或方形。後側緣在後端遇合處成為一個寬闊的鈍角(約 120°)。最大殼寬近橫中綫。鉸合綫彎曲，短於最大殼寬，主端與前側角作闊圓形。兩殼作不等的雙凸型，腕殼占有凸度的絕大部分，貝體最厚處位前緣。兩殼的前接合緣作鋸齒狀的交錯。前視時，輪廓作橫方形。側接合緣輕微地向腹方折曲，前接合緣作強烈的單褶型。

莖殼特淺，殼面的後半部緩慢地升隆，沿縱中綫凸度最強，以均勻的速度向前側緣

傾降。中槽淺，特別寬闊，似乎比具體寬度的二分之一還大一些，自臍部的近前方即開始顯露。中槽底部的後半段作狹隆形，向前方延伸時則逐漸增加深度，槽底也轉變為平坦。中槽前端急驟而強烈地向背方彎折，作成一個闊長的舌形延伸體，舌形體和兩殼間的接合面的交角近於 90 度。臍部狹長，凸隆。殼喙小，尖聳，強烈彎曲，俯臨腕殼喙部之上。莖孔小，圓形。

腕殼的凸度遠強於莖殼，前半部分尤為高隆。殼面中部被一寬闊的中隆所佔據，寬度約等殼寬三分之一。在臍部的稍前方開始出露，迅速升高，以達前緣；隆頂闊平，傾斜形狀很像兒童遊戲場中的滑板。中隆前端驟然作 90° 的膝折，延伸不遠即與中槽的舌形體相連接。殼面的翼部凸度亦強，邊緣部分也作 90 度的膝折以連接莖殼。由於中槽的高聳和翼部殼面的狹傾，使腕殼背視時，呈顯著的三葉形。喙部彎曲，隱於莖殼窗孔的下面。

沿腕殼中隆的縱中綫，有一狹淺的凹溝，刻劃顯明，使中隆呈雙葉狀。在相對的情況下，沿莖殼中槽的縱中綫，則作輕微的凸隆。

具體外部全體復有多數的褶綫，部分褶綫具分枝。在殼面的臍部，飾褶並不顯明，但向前方延伸時，則逐漸增加強度。褶綫的橫切面，一般作圓形，膝折後則變為坦平，並在各綫的中部顯一淺弱的縱溝。中槽內一般具褶綫 9 個，中隆上 8 個，側翼上 12—13 個。隔隙狹淺，膝折後刻劃較顯明。

標本度量(毫米):長 11.9, 寬 12.7, 厚 11.4, 鉸合綫寬 9.6。

標本類型:全型, 中科院所 8028。

討論: *Ucinulus* 是小嘴貝超科腕足類在古生代后期某種特殊發展方向的代表, 和它近似的屬有 *Hypothyridina* Buckman 與 *Ucinunellina* Grabau 等。在外形上, 這三屬有顯明易辨的共同特性: 它們的具體都近於球狀, 輪廓多呈五角形; 中槽、中隆在殼面的後半部分低弱不強, 在前部則聳隆極高, 並且中槽前端都向背方驟然膝折, 延伸成爲一個長舌體; 兩殼前端的接合緣交錯若鋸齒; 褶綫的後部爲圓形, 前部則變爲坦平, 並被一淺狹的縱溝所劃分。

就地質時代而言, *Ucinulus* 出現最早, 在北美首見於志留紀的后期, 延至下泥盆紀即滅絕; 在亞歐兩洲, 則中泥盆紀下部岩層中, 仍然可以找到不少的 *Ucinulus* 的標本。*Hypothyridina* 產生的時代稍爲晚一點, 也是北美種的出現早於歐亞的種。在北美, 它佔據的層位, 自下泥盆紀的上部起, 止於上泥盆紀的中部; 在歐洲和我國, 中泥盆紀早期才有 *Hypothyridina* 的代表, 也滅絕於上泥盆紀的中部。*Ucinunellina* 的地質歷程是上石炭紀到二疊紀。

Uncinulus 和 *Hypothyridina* 在外貌上雖然很接近，但就內部構造而言，則莖、腕兩殼都有差異。*Uncinulus* 的莖殼筋痕面特大，凹陷很深，啓筋痕作扇形；齒板發育；腕殼內部像 *Camarotoechia*，有一個高強的中隔板。*Uncinulellina* 的內部構造與 *Uncinulus* 差不多；但外貌上，它的中槽和中隆，僅顯露在具體的前緣；同時，殼面後半部分的飾褶異常微弱，幾乎近於平滑。

現在我們進一步討論當前的新種。*Uncinulus mesoflectus* 在一般外貌和長大的莖殼中槽舌形延伸體兩特點上，非常接近 Schnur^[11]所描述的德國 Eifel 地方的標本，如：“*Terebratula*” *pila*，“*T.*” *orbiniama*，“*T.*” *goldfussi* 和 “*T.*” *subcordiformis*，四者中最相像的是 “*T.*” *goldfussi*。其不同處，在於新種具體的輪廓近於圓形，腕殼前部的凸隆度較強，中槽比較寬，超過殼寬二分之一以上；同時，歐洲種的標本，也遠大於我們的新種。

在北美，由中志留紀到下泥盆紀，有若干地層都產 *Uncinulus*，種別很多。泥盆紀的重要種有：*Uncinulus ventricosus* (Hall)^[12]與 *U. nucleolatus* (Hall)^[13]等。由外表觀察，北美產各種都具近三角形的輪廓，中隆的前部升凸不太高，並且殼面飾綫的數目也比較稀少而簡單。

超科 Spiriferacea (石燕貝) Waagen 1883

屬 *Elytha* (愛利沙石燕貝) Fredericks 1918

Elytha transversa Wang sp. nov. (新種)

(圖版 I, 三; 圖 1—5)

具體在屬中為較大者，輪廓近於橫闊圓形，最大殼寬位橫中綫的稍後方，鉸合綫短於最大殼寬。主端銳圓形，側緣及前緣的曲度均勻而寬闊，後緣在喙部作成的交角約近 125°。全貝側影作強烈的雙凸型，莖殼的凸度稍強。前緣作狹的單褶型。

莖殼沿縱中綫，自殼喙起以至前緣，作強烈而整齊的凸隆，殼面後半部的彎曲度頗急峻，前半部則比較緩勻。交互面長，斜傾型，微彎曲，向兩側逐漸減低高度。窗孔大，作等邊三角形，全部被一個高凸的假窗板所復掩。中槽顯著，深度適當，具闊圓的槽底；中槽自喙部起即開始出露，向前方緩慢地加大寬度，前端延伸成為一個短的舌形體。臍部狹隆，向兩側迅速地傾降，但向背方突伸時，則超越交互面。殼喙小，尖銳，強烈地彎曲，作鈎形。

腕殼沿縱中綫，自殼喙起以至前緣，僅作緩平的凸隆。殼面後部的彎曲度較前部為強；兩側翼的凸度更為坦平，由側緣向縱中綫均勻地逐漸升高。中隆甚強大，隆頂作圓

形, 开始于喙部, 向前方迅速地增加高度, 俯臨兩側低平的翼部殼面上, 前端为莖殼的舌狀延伸体所截切。交互面特短, 尙不达一厘米, 正傾型。窗孔闊。臍部狹凸。喙部小, 不顯著, 強烈弯曲。

兩殼外部飾褶相当低弱, 褶形闊圓, 粗大而簡單, 均發生在臍部的頂端。每一殼翼僅具有飾褶兩個, 發育都不强大, 莖殼面上的更不明晰。殼面全部复有同心狀的生長層, 分布整齐, 各層相距約一厘米, 向前方逐漸密聚。沿每一个長生層的前緣, 更具有一排梳狀的細短刺痕。

标本度量(毫米): 長 24.2, 寬 37.0, 厚 16.8, 鉸合綫寬 30.6。

标本类型: 全型, 中科院所 8029。

討論: *Elytha* 是中、上泥盆紀的标准化石, 在亞、歐及北美都有代表。它的外貌和 *Delthyris* Dalman 和 *Crispella* Kozlowski 都很接近。与前者的区别, 在于 *Elytha* 的具体一般比較巨大, 并且莖殼內部沒有中隔板。与后者的差异, 主要的是 *Elytha* 的鉸合綫短于最大殼寬, 同时殼面飾褶也特別低弱。在地層时代上, *Crispella* 產于中、上志留紀, *Delthyris* 產于中志留紀至下泥盆紀, 而 *Elytha* 則限于中、上泥盆紀。

Elytha transversa 是郁江建造中非常稀少的腕足类, 在已知的材料中, 僅有一个标本。依一般特性而論, 本新种和北美上泥盆紀 Lime Creek 層所產的 *Elytha inconsueta* (Fenton and Fenton) 頗为近似。与 Stainbrook^[14]所引用的附圖对照, 可以看出 *Elytha transversa* 与 *E. inconsueta* 都具有闊圓的主端, 強烈双凸型的具体, 和發育良好的中槽与中隆。但詳細比較, 則可以看出 *E. transversa* 的輪廓是橫長的橢圓形, 殼寬几乎等于殼長的兩倍, 殼面翼部的飾褶数目比較稀少, 而同心狀飾層間的距离則比較寬远。

在苏联庫茲涅茨盆地的边緣区, 中泥盆紀地層內, 富產 *Elytha* 屬腕足类, 計有 *E. pseudoaculeata* Rzonnsnitskaya^[15]和变种 *E. pseudoaculeata* var. *tshumyschensis* Rzonnsnitskaya 等。与我們的新种相比較, 很容易看出庫茲涅茨盆地所產各种, 一般具体都比較小, 而輪廓多近于方形, 同时, 中槽、中隆則相当寬闊。因此, 区别 *Elytha transversa* 与 *E. pseudoaculeata* 并没有困难。

就 Schnur 論文的附圖來看, Eifel 区所產的 *Spirifer undiferus* (Roemer) (Schnur: 1853, 圖版 34, 圖 3e, f), 不僅鉸合綫較短, 并且飾褶也低弱簡單, 很像是 *Elytha* 的一种。但 Schnur 的附圖上, 沒有顯出殼面上同心層和刺痕等裝飾。如果 *Spirifer undiferus* 确实是一种 *Elytha*; 則由于它具体寬度較小, 飾褶狹而多, 莖殼的后方更特別聳隆, 也很容易与当前的新种相区分。

屬 *Mucrospirifer* (尖翼石燕貝) Grabau 1931*Mucrospirifer increbescens* Wang sp. nov. (新種)

(圖版 II, 一; 圖 1—5)

貝體巨大，輪廓作橫長的三角形，殼寬遠大於殼長，兩者比例約為 2:1，最大殼寬位於鉸合綫上。鉸合綫直，主端近銳角，展伸若翼；尖端易破斷，普通標本上很難保存。貝體側影近於等的雙凸型，腕殼的凸度較強。側緣及前緣均勻的闊圓形。前接合緣狹的單褶型。

莖殼緩勻地升隆，最高的凸起處位於殼面中部的稍後方。自最高處開始，殼面急峻地傾向殼喙，較緩和地趨向前緣，向兩主端低降時，凸度更為緩弱。交互面頗發育，最長處達 6 毫米，兩側的部分平直，趨向中綫時，則逐漸凹曲，近殼喙處更為顯明。交互面上被多數縱的細紋與較粗的橫綫所裝飾。窗孔大，洞開，寬度與闊度近相等；窗孔兩側為高聳的緣脊所限制。中槽寬度並不太大，自喙部即開始顯露，槽底最初作闊稜形，凹陷較淺，向前方延伸時，不僅深度迅速增加，槽底也成為圓形；中槽前端的舌狀延伸體狹短。殼喙尖小，強烈彎曲。

腕殼的凸度較強於莖殼，最高凸隆處位於殼面的中部。沿縱中綫，殼面的彎曲度較急峻，沿橫中綫的彎曲度則作闊圓形，主端近前方的殼面凸度更為低平。交互面特短，在喙部兩側高僅 1 毫米，主端附近更為短弱。中隆狹，自喙部即開始出露，向前方延伸時，迅速增強；隆頂作圓形，隆側斜度很峻峭，前端被莖殼中槽的舌形體所截切。殼臍腫脹，喙部彎曲若鈎。

除中槽中隆外，殼面側部被粗強的殼褶所裝飾，每一側翼具殼褶 6—7 個。褶形簡單，頂部成闊稜，為較狹的隔隙所劃分。全部殼褶都自喙部即開始出露，殼褶的強度由中部向兩側逐漸遞減。

在保存完美的標本上，殼面全體更具有美麗的同心層，以致貝體若復鱗片。每一同心層的寬度約為一毫米，近殼面前緣處比較密聚。

標本度量(毫米)：長 29.8，寬 62⁺，厚 27.2。

標本類型：全型，中科院所 8030。

討論：*Mucrospirifer increbescens* 是研究材料中最豐富的標本，保存情形一般都相當完好，稍加修整，即可顯示殼面裝飾的全部。多整全的貝體，而缺少分離的莖殼與腕殼。

僅就外貌而言，*Mucrospirifer increbescens* 和 *Rostrospirifer* 的若干種，頗有許多

近似的形态。其主要区别,在于壳面装饰与壳的内部构造。依葛利普^[16]创立 *Mucrospirifer* 时所给予的定义,本属最主要的属征是:壳体全部复有均匀而显著的鳞片状同心层,同时,主端作翼状展伸,壳褶简单,褶顶凸隆作半稜形。*Rostrispirifer* 则相反,不仅壳褶多平圆形,并且壳面平滑,没有鳞片状饰层的存在。

Mucrospirifer 与 *Rostrispirifer* 的壳内部构造,差异更为显明。*Rostrispirifer* 的齿板特别强大,向前方伸展,环绕筋痕面的两侧。*Mucrospirifer* 的齿板则发育较弱,有时更不存在,存在时也相当低短。

Mucrospirifer increbescens 的主要特性,在于它的具体特别巨大,轮廓作宽阔的三角状,壳面饰褶简单而稀疏。

De Koninck^[17]曾记述一个云南(?)中泥盆纪后期石燕型腕足类的标本,名为“*Spirifer*” *cheehiel*。与 *Mucrospirifer increbescens* 相比较,两者的轮廓和饰褶性质,都相当接近。但葛利普^[18]曾指出,“*S.*” *cheehiel* 的特点,除去它的中隆和中槽宽阔而低浅外;同时,在隆、槽的前端有轻微的浅沟,把隆、槽的前部分割成为三叶形。此与 *Mucrospirifer increbescens* 的简单而高深的隆、槽特性,很容易互相区分。

在德国 Eifel 区泥盆纪化石群中,“*Spirifer*” *undosus* Schnur (Schnur: 1853, 图版 35, 图 1 a-c) 是惟一具稜形饰褶和鳞片饰层的石燕型腕足类。与当前的标本比较,“*S.*” *undosus* 的具体比较小,中槽和中隆则较宽大,壳翼的饰褶也比较密集。

超科 *Rostrospiracea*(嘴螺贝) Schuchert 1929

属 *Meristella*(小双分贝) Hall 1860

Meristella grandis Wang sp. nov. (新种)

(图版 II, 二; 图 1—5)

具体巨大。轮廓近似横长方形,最大壳宽约位于横中綫,铰合綫稍短于最大壳宽。主端钝圆形,前侧角阔圆状。具体的两侧綫弯曲度极缓,差不多近似平行的直綫。侧接合綫向腹方曲折。前接合綫作狭的单褶型。壳面侧影成不等的双凸型,腕壳具较强的凸度。

壳的凸度颇平缓,沿纵中綫的弯曲度大于沿横中綫者。壳面在中部很平阔,向铰合綫及前缘则急骤地倾降,在喙部和中槽前端附近,壳面极为陡峻,几近直立;侧区的一般凸度则比较坦缓。中槽在喙部附近很不明显,时常自脐部前方才开始出露,槽底的曲度最初作圆形,以致槽缘与壳面的界限不易确定,但向前方延伸时,则深度逐渐增加,最前端并作成一个小舌状体。最大的中槽宽度约为壳宽三分之一。喙部小,强烈弯

曲，几与腕殼的臍部相接触；有时殼喙頂部被蝕剝，使狀若圓形莖孔。交互面不顯明。窗孔全部被腕殼的喙部所充填。

腕殼的凸度远强于莖殼，最高隆起处位殼面中部的后方。殼面沿縱中綫的弯曲度均匀而緩慢，但近臍部处則稍陡峻；沿橫中綫，殼面的凸隆度相当强，向側緣迅速地傾降。中隆狭，自臍部前方才开始顯露，隆升高度并不强；隆頂作圓形，与兩側的殼面分界不甚明晰。喙部强烈弯曲，隱掩在莖殼窗孔的下面。

就标本表面剝蝕殘存的殼皮來看，除具不明顯、狹的同心紋外，并没有發育良好的褶層。

标本度量(毫米)：長 34.8，寬 42.8，厚 26.6。

标本类型：全型，中科院所 8031。

討論：这一种腕足类的标本，在六景地区郁江建造中也比較众多，但殼皮非常容易剝落，保存情况沒有理想中那样好。它的主要特性，除具体比較巨大外，輪廓也反常地作橫闊的長方形，腕殼側影的凸度也特別高强。

在腕足类鑑定工作上，最容易和 *Meristella* 相混淆的标本，就是 *Athyris*。此兩屬腕足类都常見于泥盆紀岩層內，在野外采集时，兩者差不多可以同时碰到。它們的具体輪廓与殼面裝飾的变化，式样又非常繁多。因此有必要談一談 *Meristella* 与 *Athyris* 的区别：

Meristella：具体或大或小，兩殼的側視投影，多数种是等的双凸型，但有时則莖殼或腕殼的凸度比較强；輪廓一般都是長大于寬，或作長卵形。莖殼喙部突聳，强烈弯曲，使頂端隱伏不見；腕殼喙部完全掩沒在莖殼喙的下面。幼年具体常具一个圓形莖孔，老年殼的喙部被蝕剝后，也多成莖孔的形狀。莖殼的中槽和腕殼的中隆比較發育，但多在具体的前部始現露。殼面平滑，前部偶有少数輕微的生長綫，但很少成为層皺。

莖殼內部有异向互分的齒板，向前方延伸，环繞筋痕面的后部。筋痕面凹陷頗深，作成一個梯形或三角狀的窟穴。腕殼內有分离的鉸板与强大的中隔板，隔板后端具有一个小腔。腕鎖簡單。

Athyris：具体也是或大或小。大多数种的輪廓都是橫方形，但也有圓形或長卵形者。兩殼側視的投影几近于等的双凸型，凸隆程度并不强烈。莖殼喙部聳立，弯曲緩弱，頂端的圓形莖孔顯著，容易辨識。莖殼中槽与腕殼中隆不發育，僅微露在具体的最前緣；中隆的凸度更低平，几乎可以說并不存在。殼面全体具密聚的生長綫，有时成叠層狀，但也有少数种的殼面是平滑的。

莖殼內部的齒板短矮，直立在窗腔的兩側，并不向前延伸。筋痕面很大，作扇狀，前

端几达壳体的中部。腕壳内铰板顶端被圆形的体腔孔所洞穿。中隔板低。腕锁复杂。

按照上述属征来判断当前的标本, 著者认为除去它的横方形的轮廓, 接近于 *Athyris* 以外; 其他特点, 如: 强烈弯曲的莖壳喙部, 不显露的莖孔, 较强的中槽和中隆, 比较平滑的壳面等, 似乎都表示把它置入于 *Meristella* 属内较为适合。

新种的具体特别巨大, 此在 *Meristella* 属中殊为少见。Schnur 曾记述一个德国 Eifel 所产标本, 叫做 "*Terebratula concentrica* (Schnur, 1853, 图版 44, 图 9a-c)。后来 G. Gürich^[19] 编著德文版“泥盆纪指示化石”时, 曾予采用, 更名为 *Athyris concentrica*。Eifel 的标本也很巨大, 和我们的新种差不多; 同时, 具体轮廓也近于横方形。但 Schnur 和 Gürich 的附图都表示 Eifel 的标本, 壳面上具有密聚的同心状饰层, 中隆不十分显著, 而两壳的凸度也比较低。如上所述, *Meristella* 与 *Athyris* 是难以由外部形态来区分的; 所以目前的鉴定结果, 系为暂时性质, 待日后详细研究同类标本的内部构造后, 才可以作确切的决定。

超科 Strophomenacea (扭形贝) Schuchert 1896

属 *Cymostrophia* (波纹扭形贝) Caster 1939

Cymostrophia quadratus Wang sp. nov. (新种)

(图版 III, 一; 图 1—4)

具体特薄, 在前缘上, 莖、腕两壳共厚尚不及一毫米的二分之一。具体轮廓近正方形, 铰合缘直, 几等于最大壳宽; 主端钝角状。两壳侧视作强烈的凹凸型, 沿壳体的横中綫作圆形的弯折; 两壳的曲度近于相等, 以致遗留的体腔非常浅薄。

由于标本的保存情况不佳, 无法了解具体侧缘的性质。

莖壳强烈地凸隆, 状若复幕, 凸起最高处约近壳面的中部。壳面向后方与侧缘的倾斜速度都很陡峻, 向前缘则较缓慢, 接近两主端附近, 壳面更为坦平, 状若展翼。臍部轻缓地凸隆。喙部极小。交互面平直而低短, 逐渐向两侧降低其高度; 内缘全部具密集的副铰齿。窗孔狭小, 不显明, 为平的假窗板所复掩。

腕壳凹陷极深, 最深处也近于壳面的中部, 体腔区的壳面平展, 侧缘与前缘则急骤地弯升。交互面较莖壳的更短, 尚不及后者的二分之一, 但由中部向两侧, 高度并未减少; 内缘也具密聚的副铰齿。臍部轻微地凹陷。窗孔极小, 亦为背窗板所复掩。

两壳外部被多数的放射纹所装饰, 次增壳纹作插入式。在莖壳上, 首期壳纹作狭菱形, 刻划明晰; 壳纹间的隔隙很宽, 隙间壳面向背方凹陷; 每一隔隙内有十个或更多的特别微细的次生壳纹。在腕壳上, 首期壳纹较莖壳者更细或不显明; 向前方延伸时, 到壳

面中部即消失不見，前部成为寬闊的凹溝，与圓凸的隔隙整齐并列；細弱的次生殼紋遍布全体，較莖殼者为強。

除上述放射狀飾紋以外，在殼面的后半部或体腔区，兩殼更有強烈的同心形波皺，刻划美丽，分布整齐，僅見于隔隙間，并不影响放射紋。

标本类型：全型，中科古所 8032。

討論：在研究材料中，这种腕足类的标本非常稀少，到目前为止，著者僅獲得四个。由于它的壳体較大，凸隆很高，同时殼質特薄，所以很难保存完整，大多数标本的邊緣部份都破裂损坏。标本保存虽說不佳，但归入 *Cymostrophia* 屬內，似乎沒有重大的錯誤，因为这一屬腕足类在齒扭形貝科(Stropheodontidae)內，独具特异的波皺形殼飾。

Cymostrophia 系 K. E. Caster^[20] 1939年所創，型种是捷克 Konieprus 地方 Konieprus 石灰岩內所產的 *Leptaena stephani* Barrande^[21]。依据 Caster 所定的屬征，此屬齒扭形貝的壳体一般都很大；殼面裝飾特別細弱，由相距頗远的首期飾紋与密聚的次生細紋所組成；同时，殼面更有發育顯明的同心狀波皺。

关于 *Cymostrophia* 的内部構造，虽說歷經 K. E. Caster, 和 A. Williams^[22] 等人詳細研究；但直到目前，仍然是一个沒有徹底了解的問題。Williams 曾根据美國國家博物院所藏标本，并参考 Barrande 的附圖，認為型种 *Cymostrophia stephani* 的莖殼內筋痕是短的橫卵形，很像 *Megastrophia* 者；交互面的內緣全部具有副鉸齒；莖殼窗孔似乎被假窗板所复掩。关于 *C. stephani* 腕殼的内部構造，至今還沒有可供研究的材料。Williams 又曾觀察本屬在北美的代表种 *C. patersoni* 的若干材料。有一个產于 Virginia 州 Onondaga 層 的标本，顯露出它的腕殼具分离型的主突起，主突起上的筋痕附着面指向后方；鉸窩板不顯著；兩閉筋痕相距很远，被一对相鄰較近的凸脊所分离；凸脊的前部并具有突刺。但此标本殼面的波皺狀裝飾異常輕微，很可能不是一个 *Cymostrophia* 另外一个标本是保存美好的莖殼，產于 Indiana 州 Jeffersonville 石灰岩內。虽說殼面裝飾毫無問題是 *Cymostrophia* 类型，但殼內筋痕面呈長方形，左右筋痕近于平行，与 *C. stephani* 者大有区别。

由上所述，我們可以看出，*Cymostrophia* 在欧美兩地的代表标本，外貌虽說相当接近，但内部構造则差异很大。因此，*C. stephani* 与 *C. patersoni* 兩者，究竟是否应当归入一屬，仍待將來有較好的材料，作進一步的深入研究后，始可決定。我國标本的殼面裝飾保存很好，首次殼紋隔隙間的殼面，在莖殼为凹陷，在腕殼为凸隆的性質，过去工作者還沒有人提到过。同时，根据我們的材料，也可以証明交互面的內緣确实全具副鉸齒，而莖殼窗孔全部被一个假窗板所复掩，腕殼窗孔上也有一个橫延的微弱窗板。但遺

憾的是,我們也沒有顯露內部構造的标准。著者很希望今后工作者注意搜求,以便由我國的材料,解决这一个懸而未决的問題。

現在可以討論新种 *Cymostrophia quadratus* 与 *C. stephani* 和 *C. paterstoni* 的异点:

Cymostrophia quadratus 与 *C. paterstoni*^[23]就它們的近方形的輪廓,闊圓的側緣曲度和美丽的殼面裝飾各种特性來看,彼此是相当接近的。但如果詳細观察,則不僅兩种在具体的大小上有所不同,就是殼面飾紋性質也有若干差异。新种的具體一般講,比北美种小得很多,大約僅等于后者的三分之二左右。在新种莖殼殼面的前部,首次殼紋的强度远为粗强而顯著;但在腕殼上,則初生殼紋非常微弱,僅見于体腔区部分,前延則消滅不見。在新种的殼面上,次生殼紋的聚集密度也远大于 *C. paterstoni* 者。*Cymostrophia paterstoni* 產于北美 Ulsterian 时代的末期,*C. stephani* 也僅見于捷克 Vinarice 石灰岩($f\beta$)內(下泥盆紀的中部),在地質时代上都比新种 *C. quadratus* 为早。所以在中泥盆紀化石群的迁移方向問題上,*C. quadratus* 也給我們某些重要的啓示。

与 *Cymostrophia stephani* 相比較,*C. quadratus* 的具體比較小,輪廓作方形而非橫卵形,殼面裝飾也不十分相似。

屬 *Nervostrophia* (臍脈貝) Caster 1939

? *Nervostrophia gigantea* Wang sp. nov. (新种)

(圖版 III, 二; 圖 1—4)

Sulcatostrophia gigantea Wang, 1955, 中國标准化石(無脊椎动物), 第二分册, 頁 149, 圖版 85, 圖 11—13, 15。

具體巨大,輪廓橫長方形;側緣直,兩緣几近平行;前側角闊圓狀。殼寬約等殼長的兩倍,最大殼寬位具體的前端。主端作鈍角狀,偶而成短翼形的展伸。側影強烈的双凸型,前接合緣寬闊的單褶型。

莖殼強烈地凸隆,凸起最高处沿橫中綫,殼面沿此綫向前后驟然膝折,作成一橫長的隆脊。殼面向各方的傾降速度都比較急峻,尤以向前緣者為甚。中槽寬闊,自臍部即顯露,向前方延伸時,迅速加大深度,達前緣后,几乎占据殼寬的三分之一或更寬。交互面平直,斜傾型,并不太長,內緣全部具副鉸齒。窗孔部分保存不佳,假窗板似乎凸隆不高。臍部輕微腫脹。喙部小。

腕殼深凹,弯曲度几平行于莖殼。殼面在臍部与具體的后半部分相当坦平,但向前緣与側緣,則急峻地弯升。中隆低,不十分顯著,較中槽为狭;自喙部前約三分之一的殼

面处开始现露，前端被莖殼的中槽所截切。交互面低短，直傾型。臍部平緩地凹陷；喙部小。

莖殼外部被密聚的、放射形、扭曲的殼紋所裝飾，后增殼紋作插入式。隔隙較寬，在殼面兩翼处，隔隙寬度約等殼紋的二倍或三倍，在中槽部分，隔隙則比較狹。在腕殼外部，殼紋不十分顯著，但排列較整齐，隔隙也疏稀；次生細紋不發育。

标本度量(毫米)：長 19.5，寬 34.7，厚 11.2。

标本类型：全型，中科古所 8033。

討論：在郁江建造的化石群中，这种腕足类也是非常稀少的，作者僅得到兩個标本；一个标本的保存情形相当良好，但喙部和莖殼窗孔部分都已蝕落，其他一个虽遺有假窗板的痕迹，但殼面飾紋又不完整。至于兩殼的内部構造，到目前尚無所知。

当前研究中的标本，在形态上具有許多特性：它的巨大的貝体，顯著而深凹的莖殼中槽，密聚的脉絡形飾紋，都很容易引起观察者的注意。

作者 1954 年編著中國标准化石时，由于过份重視了当前标本的强大中槽与殼紋的弯曲断續性質，把它归入于 *Sulcatostrophia* 屬中。

A. Williams 于 1953 年出版論文一篇，專門討論齒扭形貝族(Stropheodontids)中各屬的相互关系和形态演化，載北美地質学会專报 56 号(古生物研究所 1955 年 11 月始購到此書)。Williams 詳細分析了 *Sulcatostrophia*, *Pseudodouwillina*, *Nervostrophia* 三屬的内外特性后，認為貝体前部中槽、中隆的有無，兩殼側影凸度的高低，莖殼假窗板的凸隆或坦平各性質，在分类的意义上并不重要。因为在齒扭形貝科各屬腕足类內，即便是同种的个体，也可以看到許多这样形式的外貌变化。这种变化大概是受小范圍內生活环境影响的結果，并不足引起基本屬性的改变。因此，著者贊成 Williams 的意見，把 *Sulcatostrophia* 和 *Pseudodouwillina* 看成与 *Nervostrophia* 是同物异名，而予以合并。

Nervostrophia 的重要屬征，在外貌上是它的輪廓多作半圓或縱的半卵形；莖殼面上主要飾紋疏少，并成断續的脉絡狀分布，隔隙間并有更細的次要飾紋；腕殼面上則以次要的飾紋为主，主要飾紋不顯著。在莖殼内部，筋痕面近于三角形。在腕殼内部，閉筋痕旁側縱脊的后方比較粗強，但向前方延伸不远即消失。

把当前标本归入于 *Nervostrophia* 并不十分適當，主要原因是由于材料的缺乏，無法了解它的内部特征。僅依外貌而論，一般的 *Nervostrophia* 如：*N. nervosa* (Hall) (*Nervostrophia* 的屬型)，*N. camerata* (Fenton and Fenton) (原为 *Sulcatostrophia* 的屬型)，*N. euglyphea* (Stainbrook) (原为 *Pseudodouwillina* 的屬型) 等，不管有沒有

中槽，它們的貝体輪廓都作半卵形或近方形，不像新种的寬度特大，成顯著的橫長方形；它們的莖殼飾紋都比較稀疏，隔隙間并具有次要細紋，不像新种僅有密聚的主要殼紋；它們腕殼上的次要飾紋都非常顯著，主要飾紋則很稀少，而新种則完全相反。如果我們承認腕足类动物划分屬別的原則，是在于貝体輪廓与殼面裝飾的基本变异，和鉸合器官（如筋痕組織与形狀等）的輕微不同，則当前的标本似乎有理由可以建立一个新屬。但因为标本数目过少，上述各項特点是否穩定，或系老年个体的特別形态，尚需等待將來有更多的材料來証实。现在暫名为 *?Nervostrophia gigantea*。

? Nervostrophia gigantea 与下面即將描述的 *Shaleria (Telaeshaleria) yukiangensis* 都屬齒扭形貝科，又共生于一地層內，似乎应当有較近的親緣关系。但兩者除去貝体側影的凹凸情形，尚屬近似以外，殼面裝飾則迥然不同。在沒有獲得本新种的內部構造标本以前，很难對它們的关系作任何結論。

屬 *Shaleria* (色乐貝) Caster 1939 (Williams 修訂)

亞屬 *Telaeshaleria* (終色乐貝) Williams 1950

Telaeshaleria yukiangensis Wang sp. nov. (新种)

(圖版 III, 三, 圖 1—5)

Sulcatostrophia yukiangensis Wang, 1955, 中國標準化石(無脊椎动物), 第二分册, 頁 149, 圖版 85, 圖 16—19, 21。

貝体較大，殼質厚。輪廓橫長方形，殼寬与殼長的比例約为 3:2，最大殼寬位鉸合綫上。側前緣及前緣闊圓形，后側緣在主端的近前方稍向內凹。主端輕微地作翼狀延伸。前接合緣有时呈不顯明的單褶型，有时則完全为直型。兩殼側影是強烈的凹凸型，殼面前部向背方弯曲。

莖殼高強地凸隆，最高凸度位殼面的中部。由喙部沿縱中綫至前緣的弯曲度較急，后部殼面更陡峻，近直立；前部殼面則傾降情形略緩；中部殼面坦平，作橫邱狀，向側緣驟降。中槽特寬，但不十分顯著。交互面平直，或微有弯曲，直傾型，几乎以同等的高度趋向兩主端。窗孔斜長，特小，被一个平凸的完整假窗板所复掩。臍部寬闊，輕微地腫脹；殼喙小。

在莖殼的內部，交互面的內緣上全具密聚的副鉸齒，排列整齐，刻划頗深。鉸齒小，無齒板。筋痕面特大，几乎占有全部內腔的二分之一，向前方闊展作双叶型，側緣被聳立的狹脊所限制。狹脊在后部很高強，向前則逐漸降低。閉筋痕長卵形，凹陷頗深，被一个中脊所分割。中脊在窗腔下較粗大，作圓柱形，中部則異常低弱，若斷若續，前端則

又凸隆甚高，并成一菱形凸体。啓筋痕極闊大，等于閉筋痕的四倍；在閉筋痕后端的兩側，最初作三角形；向前方延伸时，迅速地增加寬度，成为長方形；最前端并异向互分。筋痕面的兩側与前方，都具有密聚的突刺，內腔圍緣并有不規則的膜痕。

腕殼强烈地凹陷，凹陷最深处沿橫中綫。殼面沿此綫向前后及側緣迅速地高升。臍部与喙部很不易辨識。交互面非常短，作狹綫狀，正傾型。窗孔亦狹小，被一个凸的背窗板所复掩。

腕殼的内部構造尚不了解。

殼体外部被微弱的細紋所裝飾，作插入式的增加；首次殼紋的隔隙頗寬，其間被更細的次生殼紋所分布；莖殼上的殼紋比較多而密聚。

标本度量(毫米)

	長	寬	厚	鉸 合 綫 寬
完整标本 8034	13.5	21.8	7.6	31 ⁺
莖 殼 8035	15.2	23.5	8.7	—

标本类型：全型，中科古所 8034；等型，中科古所 8035。

討論：*Telaeoshaleria* 系 A. Williams^[24]1950 年所創立，認為是 *Shaleria* 的亞屬，用德國 Eifel 地方所產 *Shaleria* (*Telaeoshaleria*) *sulcata* 作亞屬型。由 Williams 对亞屬型标本的描述，我們可以把 *Telaeoshaleria* 亞屬的特征歸納如下：

具体輪廓近方形，側影凹凸型，作輕微的膝折。具体前部有不顯明的中隆与中槽。莖殼交互面斜傾型，窗孔被一个狹凸的假窗板所复掩。腕殼交互面正傾型，背窗板不顯著。殼面飾紋特細，首次飾紋相距頗远。

莖殼交互面的內緣全体具副鉸齒；啓筋痕狹長，异向展伸，兩側被高聳的圍脊所限制；閉筋痕狹小，位于中隔脊后方的兩側。

腕殼交互面內緣亦全具副鉸齒；主突起作叉狀，筋痕附着面指向后方；鉸窩板不發育。閉筋痕区由兩对强大的狹脊所組成：外側的一对長而平行，向前方擴展成为筋痕的实际附着点；內側的一对近于三角形，被低弱的中隔脊所分离。

著者 1954 年編述中國标准化石时，还没有机会讀到 A. Williams 关于齒扭形具的研究專刊，錯誤的重視了当前标本的具体前部具有中槽与中隆各特征，而忽視了飾紋和筋痕組合的异点，把它归入于 *Sulcatostrophia*。在前節討論 *Nervostrophia gigantea* 时，已經提到 *Sulcatostrophia* 应当包括在廣义的 *Nervostrophia* 屬內。其重要特征，在于莖殼外部飾紋的一部分，作起伏不定的脉絡狀，同时，莖殼内部的筋痕面則作三角

形。与当前标本的性質，确实沒有共同之处。

在研究材料中，此种腕足类标本的殼質虽說相当厚，但殼皮很容易剝落，以致在多数标本上看不到飾紋的存在。但如果材料保存情况良好，用擴大鏡細心观察，則相距甚远的較强的主要飾紋，还是很容易辨識的，更細的次要飾紋偶而也可以看到，这是当前标本符合于 *Telaeoshaleria* 特性的第一点。在所有标本的莖殼交互面的中部，几乎都可以看到有一个完整的狭長形假窗板，并且凸隆很高，發育也非常良好，这是当前标本符合于 *Telaeoshaleria* 特性的第二点。在現有的材料中，僅有一个莖殼的内部标本，保存很美好；可以看到交互面內緣全部具副鉸齒，巨大的啓筋痕前端向兩側展伸很远，筋痕区旁緣并有高聳的圍脊，这許多特性也都符合于 *Telaeoshaleria*。

除上述相似的各点以外，我們的标本也具有若干独特的性質——最主要者就是筋痕面的形狀。由 Williams 的描述文字和屬型种的附圖來看，*Telaeoshaleria* 的筋痕面的側緣相当直，啓筋痕与閉筋痕都狹而長。但在我們的标本上，筋痕面全体近方形或圓形，啓筋痕特別長大而寬闊，側緣也作弧形的弯曲。

总结以上分析，我們的标本在外部形态上，确实接近于 *Telaeoshaleria*。但殼內的筋痕面組織，与 *Telaeoshaleria* 者又顯然不同。日后如能找到这种腕足类的腕殼内部标本，并且也具有特殊的性質，則我們的标本很可能成立一个新屬。

Telaeoshaleria yukiangensis 和 *T. sulcata*^[25] 在外形上不同的性質有下列各点：1. 具体較大，2. 長度較小，3. 主端具短翼狀的展伸，4. 兩殼的凹凸度比較強烈。

超科 Productacea (長身貝) Waagen 1884

屬 *Chonetes* (漏斗貝) Fischer de Waldheim 1857

Chonetes kwangsiensis Wang sp. nov. (新种)

(圖版 I, 四; 圖 1—4)

与屬內其它种比較，具体算是巨大的。輪廓作長方形或長的半卵形；殼長微大于殼寬的三分之二，最大殼寬位橫中綫上。鉸合綫平直，主端近直角，并輕微地向外伸展。具体側緣的后半段近于平行，以整齐均匀的弯度趋向闊圓的前緣。兩殼側影作較强的凹凸型，弯曲度約相等，因而全部体腔薄狹而均匀。

莖殼强烈凸隆，凸起最高处位殼面的中部，全殼拱起若复幕，近主端处渐趋坦平。殼面向鉸合綫的弯曲度很陡峻，向前緣与側緣的弯曲度則比較緩慢。交互面的長度近中等，向兩側展伸时，逐渐減低其高度，直傾型。窗孔小，三角形，具一圓凸的假窗板，复掩範圍約占窗孔頂端的一半。臍部腫脹。喙部不顯著。在喙部的兩側，沿交互面的后

緣,各有3—4个刺痕,彼此間的距离很远。

腕殼凹陷很深,最低处也近于殼面的中部,殼面沿后緣急峻地弯升,向前緣与側緣的弯度則比較平緩;在主端前方耳部附近,殼面更为坦平。交互面短,斜傾型。窗孔也很大,約与莖殼窗孔相等;側緣各有一个狭的窗板,位于主突起的近旁。主突起巨大,后視時呈四叶狀,占据了全部窗孔的内部。

兩殼外部被平圓的殼紋所裝飾,强度近中等,曲折而不直,作多次插入式或分枝式的增加。沿前緣上,每5毫米距离內,約有殼紋9—10个,全部殼紋数目約90—95个。橫貫殼紋表面,有非常微細的同心紋与小的突刺,但不見于隔隙間。

标本度量(毫米):長18.2,寬25.3,厚8.0。

标本类型:全型,中科院所8036。

討論:*Chonetes* 是占据地質歷程很長的一种腕足类,自志留紀即开始出現,到二叠紀仍有其踪。虽說久經滄桑,但它仍旧保持穩定的特性,沒有發生形态上的重大变化。近年來,經過 W. Waagen, J. Hall 与 J. M. Clarke, C. L. Breger, F. R. C. Reed, W. Paeckelmann, C. O. Dunbar 与 G. E. Condra 等的研究工作,把漏斗貝科(*Chonetidae*) 中若干具有顯著特征的种,分別創立新屬以后,使 *Chonetes* 的屬性更为固定,对于鑒識,很少困难。*Chonetes* 的屬征可概述如下:

具体輪廓近半圓或半方形,殼寬大于殼長,最大殼寬沿鉸合綫。側影凹凸型,莖壳的凸度与腕殼的凹度近相等,遺留一个狭薄的体腔。莖殼交互面为橫的三角形,窗孔具低凸三角形的假窗板;沒有顯明的莖孔。腕殼交互面特別低短,窗孔也被窗板所掩复。在莖殼交互面的后緣上,沿窗孔兩側各具圓形細長的殼針一排,数目不多,愈接近主端則殼針愈为粗強。殼面上被細的放射狀殼紋所裝飾。

莖壳內具闊短的鉸齒,但無齒板。腕殼內具低的主突起,向后方聳伸;突起冠上有四个筋痕附着面,中部更被一深溝所分隔,使主突起全体作四叶型。莖殼筋痕面短闊,呈扇形,中隔脊低弱或高強。腕殼筋痕面短小,三角狀,也有一个中隔脊。具体内部殼面具密聚的突刺。

由于 *Chonetes* 占据的地質歷程很長,同时又时常和漏斗貝科中其他各屬腕足类共生一处,因此,我們在識別 *Chonetes* 的时候,应当注意它的綜合特征。大概講:*Chonetes* 的莖殼后緣一定具有斜傾的殼針;兩殼弯曲度正常,莖殼緩凸,腕殼低凹;交互面內緣沒有副鉸齒;殼面前端不具高深的中隆和中槽;具体全部复有放射狀殼紋;莖殼筋痕面短,作圓形;腕殼筋痕面特小。

鑒定 *Chonetes* 时,需要有保存美好的标本,同时能看到几种特性,才不致發生錯

誤。否則最好不要驟下判語。

自志留紀到二疊紀, *Chonetes* 在輪廓和飾紋上, 似乎也有一定的演化方向。作者初步意見, 認為: 志留紀與泥盆紀岩層中的 *Chonetes*, 一般具體都比較大, 體腔也較厚; 輪廓多半卵形, 也就是長度與寬度的相差較少; 兩殼前緣作闊圓形; 飾紋粗強而彎曲。到石炭紀與二疊紀的標本, 則具體小了很多, 體腔也極度淺薄; 輪廓多成橫長方形; 若干種的具體前緣顯露輕微的中槽和中隆; 飾紋細而直, 僅在擴大鏡下始能辨識。這種推論的正確性究竟如何, 希望能夠在今後實踐工作中, 逐步修正。*Chonetes* 既然是一種很常見的腕足類, 如果我們能找出某些固定的特性, 以辨別它的產出層位是屬於中部古生代, 抑或是上部古生代, 並不是一件沒有意義的工作。

就作者已知的文獻而言, 和當前標本最接近的舊種, 是北美 Appalachia 山區 Hamilton 層內的 *Chonetes coronatus* (Conrad)。J. Hall^[26] 與 G. A. Cooper^[27] 的著作中, 載有 *C. coronatus* 的良好附圖。互相對照, 我們可以看出, 北美種的具體寬度較小, 側影的凸度則較強, 同時, 臍部的腫脹情形也特別顯著。

超科 Dalmanellacea (德姆貝) Schuchert and Cooper 1931

屬 *Levenea* (蘭婉貝) Schuchert and Cooper 1931

Levenea depressa Wang sp. nov. (新種)

(圖版 III, 四; 圖 1—6)

具體的大小近於中等, 輪廓作方形, 具銳圓的主端, 前側角闊圓狀。殼寬大於殼長, 最寬處位橫中綫的近前方。側影近於等的雙凸型, 莖殼的凸度較強。前緣單褶型。

殼面具多數闊稜形的飾綫, 強度中等, 分枝多次, 微作簇型組合。側區殼綫向後側角彎曲。殼面蝕剝後, 顯露明晰而密聚的殼疹。

莖殼側視時凸度平緩, 殼面後半部隆起較高, 向前方緩慢地傾降。前視時, 曲度闊平。沿縱中綫, 殼面高凸, 作成一個不顯著的長狹中隆。殼體側翼部份凸起度非常坦緩。臍區狹小, 微腫脹。啄部小, 略彎曲。交互面斜傾型, 長度近中等。

腕殼側視時, 凸度作均勻的闊圓形, 前視時, 則曲度坦緩。殼面中區顯明地向腹方低陷。中槽很發育, 自喙部起即開始出露, 初作狹溝狀, 逾橫中綫後, 即迅速擴展, 達前緣後, 寬度約等殼寬三分之一。殼面翼部沿中槽兩側升隆較高, 隆起部分的后部作狹脊狀。交互面較莖殼者為短, 正傾型。

莖殼內具深陷的窗腔; 鉸齒粗強, 腫脹, 突伸頗高; 齒板低而強, 為附着殼質所聚積, 致不明顯。筋痕區闊大, 輪廓作五角狀; 閉筋痕直長, 向前方逐漸升隆; 啓筋痕作直的三

角形，深陷，遠大於閉筋痕；調整筋痕亦深陷，位於齒板的基部。膜痕展布情形不明晰，似乎有兩個主脈發生在每一個唇筋痕的前面，並向前側方延伸。在閉筋痕的前面，有一個低隆的中隔脊，向前延伸幾達殼面的中部。

腕殼內具較淺的窗腔與強大的主基。主突起顯著，粗短，突起冠雙葉型，高聳以充塞於腕殼的窗孔內；鉸窩極深，三角形；腕基粗大，遠距離地異向展伸，高聳，並被殼質所支持。閉筋痕面的輪廓近圓形，圍緣凸隆；後方一對閉筋痕較大。在前後兩對筋痕的中間，有一低隆的橫脊；此橫脊與中隔脊的交角近直角，共同把筋痕面全區分割成為四等分。中隔脊特別強大而粗寬，發生在主基下面，向前延伸，止於筋痕面的前緣。膜痕由三對脈管所組成：中間的一對發生在中隔脊的前端，並直向前方伸延；第二對位第一對的兩側，相鄰頗近，也是向前方直伸；第三對較微弱，不顯明，發生在前後兩對筋痕面間的橫脊兩側，彎曲地向側前方延展。殼面側區具多數波紋狀或細粒狀的生殖腺痕。

標本度量（毫米）

	長	寬	厚	鉸 合 綫 寬
完整標本 8037	16.9	20.0	8.5	14.9
莖 殼 8038	18.2	19.3	5.9	11.8
腕 殼 8039	18.6	21.8	3.2	15.9

標本類型：全型，中科古所 8037；等型 8038, 8039, 8040。

討論：*Levenea depressa* 的特性，在於它的兩殼的凸度比較低平，中隆與中槽相當發育；同時，殼面飾綫也特別粗強。

Levenea 的地質歷程，是由上志留紀至中泥盆紀。地理上的分布，過去已知的種，90% 產於北美，西歐也有少數標本；在北非雖曾發現，但材料過於破碎，不能鑒定種名。重要種計有：英國上志留紀 Aymestry 灰岩中的 *L. cavaliculata* (Lindström)，北美下泥盆紀 Helderberg 與 Birdsong 兩建造內的 *L. subcarinata* (Hall) 和中泥盆紀 Corniferous 灰岩中的 *L. lenticularis* Vanuxem。

和世界各地已知的種互相比較，當前新種在具體大小、輪廓形狀、側影凸度上，都和 *L. subcarinata*^[28] 相當接近。但新種莖殼的凸度均勻平緩，遠低於北美種者，而腕殼的中槽則又特別顯著。同時，新種的殼面飾紋不僅粗強，並作顯著的簇狀組合，使它很容易和國外各種相區分。

Levenea depressa 和 Schnur 所記述德國 Eifel 地方所產的“*Orthis*”*tetragona* Romer (Schnur, 1853, 圖版 37, 圖 8 及圖版 44, 圖 7) 相比較，在輪廓形狀與凸度高低方面，都

确实相当接近。但 C. Schuchert 与 G. A. Cooper 把 “*Orthis*” *tetragona* 归入于 *Isorthis* 屬。按 *Levenea* 与 *Isorthis* 兩屬均產于上志留紀到中泥盆紀地層內，分布範圍都很廣泛，但 *Levenea* 是德姆貝科(Dalmanellidae)，*Isorthis* 是具裂貝科(Schizophoriidae)。彼此主要不同的性質，在于 *Isorthis* 的兩殼凸度較強，腕殼腕基旁沒有楔板。由于我們沒有德國標本供深入的觀察，所以新種和“*Orthis*” *tetragona* 的關係，究為同屬，抑是異種同形，還有待于將來解決。

参 考 文 献

- [1] 趙金科, 1947. 廣西地層發育史. 中國地質學會志, 27, 325 頁.
- [2] Schnur, J., 1854. Zusammenstellung und Beschreibung Sämmtlicher im Uebergangsgewirge der Eifel vorkommenden Brachiopoden. *Palaeontographica*, 3, S. 169—247, Tab. 22—45.
- [3] 尹贊勳, 1938. 云南東部坡脚頁岩泥盆紀動物群. 中國地質學會志, 18(1), 44—52 頁.
- [4] 趙金科, 1947. 同前, 325 頁.
- [5] 馮景蘭, 1929. 廣西桂林义寧……十四屬地質礦產. 兩廣地質調查所年報, 2 (2), 32 頁.
- [6] 張席禔, 1929. 廣西下泥盆紀腕足類與瓣鰓類化石之鑒定. 兩廣地質調查所特刊, 3(英文), 頁 1—8, 圖版 1—2.
- [7] 乐森壽, 1937. Die Korallenfauna des Mitteldevons aus der Provinz Kwangsi, Südchina. *Palaeontographica*, 87, Abt. A., S. 46.
- [8] 田奇瑛, 1938. 中國之泥盆紀. 地質評論, 3(4), 400 頁.
- [9] Hall, James and Clarke John, M., 1894. An introduction to the study of the Genera of Palaeozoic Brachiopoda. *Nat. Hist. New York, Palaeontology*, 8 (2), pl. 57, figs. 10—14; and Cooper, G. A. 1944. Chapter IX, Phylum Brachiopoda, in “Index Fossils of North America”. pl. 118, figs. 57—61.
- [10] Grabau, Amadeus, W. (葛利普), 1931. 中國泥盆紀腕足類化石. 中國古生物志, 乙種, 3(3), 102—107 頁.
- [11] Schnur, J., 1853. 同前.
- [12] Cooper, G. A., 1944. *Ibid.*, pl. 119, figs. 38—41.
- [13] —————, 1944, *Ibid.*, pl. 119, figs. 35—37.
- [14] Stainbrook, Merrill, A., 1945. Brachiopoda of the Independence Shale of Iowa. *Geol. Soc. Amer. Mem.*, 14, pl. 6, figs. 6, 12, 13.
- [15] Ржонсницкая, М. А. 1952. Спирифериды девонских отложений окраин кузнецкого бассейна. Труды всесоюзного научно-исследовательского геологического института (всегей), стр. 73—76. таб. 4. фиг. 1—6. таб. 5. фиг. 5.
- [16] Grabau, A. W., 1931. Studies for students: Studies of Brachiopoda. 北京大学自然科学季刊, 2 (3) 408—409 頁.
- [17] De Koninck L., 1846. Notice sur deux especes de Brachiopodes du terrain Palezoique de la Chine. *Bull. Acad. de Belgique*, 13, 410, pl. 2, fig. 1.
- [18] Grabau, A. W., 1931. 同前, 369 頁.
- [19] Gürich, G., 1908. Leitfossilien des Devons, Taf. 46, fig. 5a—b.
- [20] Caster, K. E., 1939. A Devonian Fauna from Colombia. *Bull. Amer. Palaeont.* 24, No. 83, 48.

- [21] Barrande, Joachim, 1879. *Système Silurien du Centre de la Bohême*, 5, pl. 40, figs. 10—30; pl. 55 VI, figs. 1—9; and Williams, Alwyn, 1953. *Geol. Soc. Amer. Mem.*, 56, pl. 9, figs. 4—5.
- [22] Williams, Alwyn, 1953. North American and European Stropheodontids: Their Morphology and Systematics. *Geol. Soc. Amer. Mem.*, 56, p. 39—40.
- [23] Hall, James, 1862—1866. Description and figures of the fossil Brachiopoda of the upper Helderberg, Hamilton, Portage and Chemung Groups. *Nat. Hist. New York, Palaeontology*, 4, 89, pl. 13, figs. 1—5; and Williams, Alwyn, 1953. *Geol. Soc. Amer. Mem.*, 56, pl. 9, fig. 6.
- [24] Williams, Alwyn, 1950. New stropheodontid brachiopods. *Jour. Washington Acad. Sci.*, 40 (9), 281.
- [25] ———, 1953. *Ibid.*, pl. 12, figs. 14—18.
- [26] Hall, James and Clarke John, M., 1894. An introduction to the study of the Genera of Palaeozoic Brachiopoda. *Nat. Hist. New York, Palaeontology*, 8(1), pl. 16, figs. 10—11.
- [27] Cooper, G. A., 1944. *Ibid.*, pl. 134, figs. 12—14.
- [28] Schuchert Charles and Cooper, G. A., 1932. Brachiopod Genera of Suborder Orthoidea and Pentamerioidea. *Mem. Peabody Mus. Nat. Hist.*, Yale University. 4(1), pl. 14, figs. 19—21, 23, 25, 28—32.

SOME NEW BRACHIOPODS FROM THE YÜKIANG FORMATION OF SOUTHERN KWANGSI PROVINCE

WANG YÜ

Institute of Palaeontology, Academia Sinica

(Summary)

The material treated in the present paper came from the Yükiang Formation near the Luching Station, Hsiangkwei Railway, southern Kwangsi Province. The collection was made by Mr. K. K. Chao, through whose kindness I am given the privilege of studying this interesting group of brachiopods.

The entire sequence of the Yükiang Formation exceeds 230 meters in thickness, and the brachiopod fauna described in the present paper was obtained from the upper part of this formation. The fossiliferous bed is easily subjected to denudation; most of the specimens are perfectly weathered out and fairly well preserved. The fauna is dominated by brachiopods both in number of species and in individuals. The remaining macrofossils include corals, bryozoans, mollusks and trilobites. Judging from the faunal affinities of the brachiopods, the stratigraphical position of the Yükiang Formation may be correlated with the early Middle Devonian or the Eifelian of Central Europe.

In the systematic part of the paper, the following 10 species are described and discussed:

Rhynchonellacea 2: *Camarotoechia parasappho*, *Uncinulus mesodeflectus*.

Spiriferacea 2: *Elytha transversa*, *Mucrospirifer increbescens*.

Rostrospiracea 1: *Meristella grandis*.

Strophomenacea 3: *Cymostrophia quadratus*, ?*Nervostrophia gigantea*, *Shaleria* (*Telaeoshaleria*) *yükiangensis*.

Productacea 1: *Chonetes kwangsiensis*.

Dalmanellacea 1: *Levenea depressa*.

A more complete report concerning the whole brachiopod fauna of the Yükiang Formation is in the course of preparation. The material described and figured herein includes only that part of the specimens adopted in the Chinese edition "Index Fossils of China."

An English version of this paper will be published in *Scientia Sinica* Vol. V, No. 2, 1956.

圖版說明

圖版插制者是刘雪筠同志,沒有加以絲毫飾改。

圖版 I

- 一. *Camarotoechia parasappho* Wang sp. nov. (新种).....141 頁
1、2、3、4、5: 依次表示一完整个体的腹視、背視、前視、后視与側視的外形, $\times 1.5$, 全型, 中科古所 8027。
- 二. *Ucinulus mesodeflectus* Wang sp. nov. (新种).....143 頁
1、2、3、4、5: 依次表示一完整标本的腹視、背視、側視、前視与后視的外貌; 注意寬潤的中隆和中槽与具体前端的强烈膨脹情形, $\times 2$, 全型, 中科古所 8028。
- 三. *Elytha transversa* Wang sp. nov. (新种).....145 頁
1、2、3、4: 依次表示一完整标本的腹視、背視、前視与側視的外貌, 注意密聚的同心狀飾層与稀疏的殼槽, $\times 1$, 全型, 中科古所 8029; 5: 同一标本, 部份殼面放大以示飾層前緣上的刺痕, $\times 3$ 。
- 四. *Chonstes kwanziensis* Wang sp. nov. (新种).....156 頁
1、2、3、4: 依次表示一个保存完好标本的腹視、背視、側視与后視的外貌, 注意殼面飾綫的性質及主突起特征, $\times 1$, 全型, 中科古所 8036。

圖版 II

- 一. *Mu. rospirifer increbescens* Wang sp. nov. (新种).....147 頁
1、2、3、4: 依次表示一完整标本的腹視、背視、前視与后視的外貌, 注意粗強的飾槽和緣狀的假窗板, $\times 1$, 全型, 中科古所 8030; 5: 部份殼面放大以示叠瓦狀的飾層, $\times 2$ 。
- 二. *Meristella grandis* Wang sp. nov. (新种).....148 頁
1、2、3、4、5: 依次表示一完整个体的腹視、背視、前視、后視与側視的外貌, $\times 1$, 全型, 中科古所 8031。

圖版 III

- 一. *Cymostrophia quadratus* Wang sp. nov. (新种)150 頁
1、2、3、4: 依次表示一个不完整标本的腹視、背視、后視与側視的外貌, 注意殼面裝飾, $\times 1$, 全型, 中科古所 8032。
- 二. ? *Nervostrophia gigantea* Wang sp. nov. (新种)152 頁
1、2、3、4: 依次表示一完整貝体的腹視、背視、前視与側視的外貌, 注意顯著的中槽与扭曲的殼綫, $\times 1$, 全型, 中科古所 8033。
- 三. *Shaleria (Tlacoshalaria) yùxiangensis* Wang sp. nov. (新种)154 頁
1、2、3、4: 依次表示一个完整貝体的腹視、背視、后視及側視的外貌, $\times 1.5$, 全型, 中科古所 8034; 5: 腹殼內部, 示交互面后緣的副鉸齒与筋痕面, $\times 1.5$, 等型, 中科古所 8035。
- 四. *Leveneia depressa* Wang sp. nov. (新种)158 頁
1、2、3: 依次表示一美好貝体的腹視、背視与側視的外貌, 注意中槽及中隆的形狀, $\times 1.5$, 全型, 中科古所 8037; 4: 腹殼內部, 示腫大的鉸齒与筋痕面, $\times 1.5$, 等型, 中科古所 8038; 5: 背殼內部, 示主基、閉筋痕面与生殖腺痕, $\times 1.5$, 等型, 中科古所 8039; 6: 殼質的橫切薄片, 示殼疹的排列, $\times 10$, 等型, 中科古所 8040。